



КОМБИКОРМА-КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ СВИНЕЙ

Технические условия

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

УДК 636.085/.087(083.74)

Группа С14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**КОМБИКОРМА-КОНЦЕНТРАТЫ
ДЛЯ СВИНЕЙ**

Технические условия

Mixed feeds-concentrates for pigs.
Specifications

ГОСТ

9267—68

ОКП 92 9612

Срок действия с 01.01.69

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на комбикорма-концентраты для поросят-отъемышей в возрасте от двух до четырех месяцев, ремонтного молодняка свиней в возрасте от четырех до восьми месяцев, маток, подготовляемых к случке, и супоросных первого периода, маток супоросных второго периода и подсосных, хряков-производителей, а также для свиней беконного, мясного откорма и откорма до жирных кондиций.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Комбикорма-концентраты для свиней должны изготавливаться из очищенного и измельченного кормового сырья по рецептам, утвержденным в установленном порядке или рассчитанным на электронно-вычислительной машине.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2. Комбикормовое сырье, поставляемое для комбикормовой промышленности, должно соответствовать действующим стандартам или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Комбикорма-концентраты для свиней должны вырабатываться в рассыпном, гранулированном виде или в виде комбикормовой крупки.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.4. Качество комбикормов-концентратов должно соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1993
Переиздание с изменениями

С. 2 ГОСТ 9267-68

ГОСТ 9267—68 С. 3

Продолжение

Назначения показателей	Нормы и характеристики						
	для поросят-отъемышей в возрасте от двух до четырех месяцев	для ремонтного молодняка в возрасте от четырех до шести месяцев	для маток, подготовляемых к случке, и супоросных периодов	для маток супоросных второго периода и подсосных	для хряков-производителей	для беконного откорма свиней	для мясного откорма свиней
9. Наличие песка, %, не более	0,3	0,5	0,7		0,5		0,7
10. Массовая доля вредной примеси: куколия, плевела опьяняющего и головни по анализу зерна, %, не более				0,25			
спорыни	Не допускается	0,05	Не допускается		0,05		
горчака и вязеля триходесмы седой и гелиотропа опушенно-плодного	Не допускается	0,04	Не допускается		0,04		
11. Зараженность амбарными вредителями в 1 кг комбикорма, экземпляров, не более				5			
12. Массовая доля целых семян, %, не более	0,3			0,5			
в том числе семян дикорастущих растений, %, не более				0,4			
13. Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, %, не более	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7
14. Токсичность	Не допускается						

Приложения:

I. В комбикормах, предназначенных для текущего использования в осенне-зимний период, не закладываемых на хранение, допускается увеличение влажности против норм, указанных в таблице, на 1 %.