

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШРОТ КОНОПЛЯНЫЙ

Технические условия

Hempseed ground oil-cake.
Specifications

ГОСТ
17256—71

ОКП 91 4612 5499

Дата введения 01.07.72

Настоящий стандарт распространяется на конопляный шрот, получаемый при экстракции масла из предварительно обработанных семян конопли. Шрот конопляный предназначен для кормовых целей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Конопляный шрот должен вырабатываться по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.
- 1.2. По органолептическим и физико-химическим показателям конопляный шрот должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма	Методы испытаний
Цвет	Серый, различных оттенков	По ГОСТ 13979.4
Запах	Свойственный конопляному шроту, без всякого постороннего запаха (затухости, плесени, горелости, бензина и т. д.)	По ГОСТ 13979.4
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	7,5—9,0	По ГОСТ 13979.1
Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более	1,5	По ГОСТ 13496.15
Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	32,0	По ГОСТ 13496.4*
Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более	35,0	По ГОСТ 13496.2
Массовая доля золы, не растворимой в 10 %-ной соляной кислоте, в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более	1,5	По ГОСТ 13979.6
Посторонние примеси (камешки, стекло, земля и др.)	Не допускаются	По ГОСТ 11203
Металлопримеси, %, не более: частицы размером до 2 мм включ. частицы размером более 2 мм	0,01 Не допускаются	По ГОСТ 13979.5

Продолжение таблицы

Наименование показателя	Характеристика и норма	Методы испытания
Хлорорганические пестициды, млн—1 (мг/кг), не более:		По ГОСТ 17290
гексахлорана (сумма изомеров)	0,2	
ДДТ (сумма изомеров и метаболитов)	0,05	
гентахлора (эпоксид гентахлора)	Не допускается	
Остаточное содержание растворителя (бензина), %, не более	0,1	По технической документации, утвержденной в установленном порядке
Токсичность	Не допускается	По п. 2.2

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51417—99.

П р и м е ч а н и я:

1. Повышение содержания сырого жира не является дефектом.

2. (Исключен, Изм. № 2).

3. Показатель «Общая энергетическая питательность» вводится с 01.01.91. Определение обязательно.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Содержание нитратов и нитритов в конопляном шроте не должно превышать норм, утвержденных Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР.

Показатель «содержание нитритов и нитратов» определяют одновременно с введением указанного показателя в ГОСТ 9158.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

Ia. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Ia.1. Правила приемки — по ГОСТ 13979.0.

Ia.2. Показатели «массовая доля сырого протеина, золы и сырой клетчатки» предприятие-изготовитель определяет периодически, не реже одного раза в десять дней.

Хлорорганические пестициды предприятие-изготовитель определяет периодически, не реже одного раза в месяц.

В каждой партии показатели «хлорорганические пестициды» указывают на основании сертификатов на семена.

Разд. Ia. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Для проверки качества продукции должны применяться правила отбора проб по ГОСТ 13979.0 и методы испытаний, указанные в п. 1.2 настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Токсичность определяют методом, утвержденным Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР в соответствии с порядком, установленным Госагропромом СССР и Минхлебопродуктом СССР.

Нитраты и нитриты определяют методами, утвержденными Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР в соответствии с порядком, установленным Госагропромом СССР и Минхлебопродуктом СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.2.1—2.2.3. (Исключены, Изм. № 4).

2.2.4. Обработка результатов

Для определения наличия в пробе ядохимикатов сравнивают пятна, полученные при анализе исследуемого образца, с пятнами модельных растворов. При этом учитывают, что на модельных пробах ядохимикаты располагаются в следующем порядке (снизу вверх): гексахлоран (α -изомер $Rf = 0,2$ и γ -изомер $Rf = 0,27$), 4,4'-ДДТ (основное пятно $Rf = 0,38$), 2,4—ДДТ ($Rf = 0,57$).

Шрот считают пригодным для использования в кормовых целях в том случае, если:

пятно, соответствующее гексахлорану, будет менее интенсивным, чем модельное пятно, содержащее 10 мкг указанного препарата в пробе;

пятно, соответствующее ДДТ, будет менее интенсивным, чем модельное пятно, содержащее 5 мкг указанного препарата в пробе.

Чувствительность определения ядохимикатов в шроте — 0,1 мг/кг.