

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

КИРГ. РЛГ
Контрольный



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

до 01.07.95 (10-89)

ЛИСТ СКУМПИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 4564-79

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством медицинской промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Беликов, Т. В. Точкина, Г. Т. Сиренко

ВНЕСЕН Министерством медицинской промышленности

Зам. министра Е. М. Шмаков

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 февраля 1979 г. № 754

ЛИСТ СКУМПИИ
Технические условия
 Leaf of smoke tree.
 Specifications

ГОСТ
4564—79

Взамен
 ГОСТ 4564—49

Постановлением Государственного комитета ССР по стандартам от 26 февраля 1979 г. № 754 срок действия установлен

с 01.07.1980 г.
 до 01.07.1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на высушенные листья дикорастущего и культивируемого кустарника скумпии кожевенной — *Cotinus coggygria* Scop. (*Rhus cotinus* L.), семейства сумаховых — *Anacardiaceae*, используемые в качестве лекарственного сырья.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Листья скумпии должны быть собраны в летний период (июнь — август) и соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Изломанные или реже цельные крупные листья с длинными черешками и перисто-нервным жилкованием. Длина цельных листьев от 3 до 12 см, ширина от 2 до 6 см. Листовые пластиинки округлые или овальные, реже обратнояйцевидные, у вершины тупые или слегка выемчатые, у основания округлые,

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1979

Продолжение

Наименование показателя	Характеристика и норма
Цвет	реже клиновидные. Край листьев цельный, иногда с несколькими неглубокими волнистыми выемками; поверхность сверху голая, снизу (под лупой) слабо опущенная. На нижней стороне листа жилки сильно выдаются. Боковые жилки второго порядка в количестве 7—14 отходят от главной жилки под углом 50—90°. Жилки третьего порядка тонкие отходят почти под прямым углом.
Запах	Пластиники листьев сверху зеленые, снизу — сизовато-зеленые, иногда с красновато-фиолетовым или желтоватым оттенком; черешки и главные жилки светло-зеленые или чаще с буровато-фиолетовым оттенком
Вкус	Ароматный
Влажность, %, не более	Вяжущий
Массовая доля общей золы, %, не более	12
Массовая доля танина, %, не менее	7
Массовая доля суммы флавонолов %, не менее	15
Массовая доля почерневших листьев, %, не более	1
Массовая доля других частей скумпии (ветвей, стеблей, цветков, плодов), %, не более	2
Массовая доля частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм по ГОСТ 3924—74, %, не более	7
Массовая доля посторонних примесей, %, не более:	4
органической (части других неядовитых растений)	1
минеральной (земля, песок, камешки)	1
Наличие плесени, гнили, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании	Не допускается

1.2. Анатомическое строение листа скумпии (см. чертеж) должно соответствовать следующему описанию.

При рассмотрении листа с поверхности под микроскопом видно, что клетки верхнего и нижнего эпидермиса с почти прямыми стенками, имеющими четковидные утолщения, клетки нижнего эпидер-