

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ПЕНЬКА ТРЕПАННАЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 10379-76**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом  
промышленности лубяных волокон (ЦНИИЛВ)**

Зам. директора **Л. Н. Гинзбург**

Руководители темы: **В. С. Пронькин, Ю. М. Винтер, С. М. Кирюхин.**

Исполнители: **А. Л. Сизова, Л. Д. Кашковская, Л. В. Букварева, В. А. Петрова**

**ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

Начальник технического управления Член Коллегии **Г. Е. Зайцев**

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзовным научно-исследова-  
тельским институтом стандартизации (ВНИИС)**

Директор **А. В. Гличев**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-  
ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 сентября  
1976 г. № 2078**

## ПЕНЬКА ТРЕПАННАЯ

## Технические условия

Scutched hemp  
Technical specification

**ГОСТ**  
**10379—76**

Взамен  
ГОСТ 10379—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 сентября 1976 г. № 2078 срок действия установлен

с 01.07.1977 г.  
до 01.07.1982 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на трепанную пеньку — длинное параллизованное волокно, получаемое в результате заводской обработки моченцовой, стланцевой и паренцовой тресты конопли и предназначенное для изготовления различных крученых изделий и тканей.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трепанную пеньку в зависимости от показателей качества подразделяют на четыре сорта:

отборный, 1, 2 и 3-й — для моченцовой и паренцовой пеньки;  
1, 2, 3 и 4-й — для стланцевой пеньки.

По качеству волокно должно соответствовать требованиям, указанным в таблице.

1.2. При отклонении одного из показателей внешнего вида волокна, установленных для каждого сорта волокна, в сторону ухудшения, кроме недомочки (недолжки), волокно оценивают сортом ниже.

При отклонении двух и более показателей внешнего вида от требований, установленных для каждого сорта, оценку производят по наихудшему показателю.

1.3. По показателям разрывной нагрузки, линейной плотности, содержанию костры, лапы и наличию недомочки пеньку оценивают по наихудшему показателю.

## Характеристика внешнего вида волокна

## Моченцовая трепанная пенька

Сорт мебельки	Паспартуная харпьская, крс, не менее	Линейная морхочка, терь, крс, не менее	Горячекашане костри, %, не менее	Горячекашане матрац, %, не менее	Паспартуная морхочка, бордюра, крс, не менее	Горячекашане костри, %, не менее	Паспартуная морхочка, бордюра, крс, не менее	Горячекашане матрац, %, не менее	Паспартуная морхочка, бордюра, крс, не менее
Отборный	30	50	3	0,5	1	80	—	1	80
	28	20	14,3						
	25	21	4	1,2	3	80			
1	28	50	5	1,5	5	80			
	21	20	19						
2	24	50	6	2,0	10	—			
	19	20	33						
3	20	50	6	2,0	10	—			
	17	33							

Волокно однородное по длине и цвету. Цвет волокна светло-желтый, светло-зеленый, светло-серый. Не допускаются потемневшие, побуревшие, недомоченные пряди, пухливость, обсечченность, присущая костра и зажужченность.

Цвет волокна желтый, зеленый и светло-серый. Допускаются при дли серого цвета и пряди волокна недомоченного в позначительной степени. Не допускаются потемневшие и побуревшие пряди, пухливость, обсечченность, присущая костра и зажужченность.

Цвет волокна желтый, зеленый и серый. Допускаются потемневшие, побуревшие, недомоченные пряди, пухливость, обсечченность, присущая костра. Не допускается зажужченность.

Цвет волокна желтый, зеленый и серый. Допускаются потемневшее, побуревшее волокно, недомоченные горсти, пухливость, обсечченность, присущая костра, зажужченность.

## Парецовая трепаная пенька

Отборный	30	40	3	—	1	80	Волокно лентистое, тяжеловесное, однородное по длине и цвету. Цвет волокна желтый, светло-табачный, светло-коричневый с зеленоватым оттенком. Не допускаются лубообразные пряди, пухливое волокно, присущая костра
1	28	50	4	—	3	80	Волокно лентистое, однородное по длине. Цвет табачный, темно-желтый и светло-коричневый с зеленоватым оттенком. Допускается незначительная неоднородность по цвету. Не допускаются лубообразные пряди, обсечченность, пухливое волокно, присущая костра