



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ХОРЯ БЕЛОГО,
ХОРЯ ЧЕРНОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11146—65

Издание официальное

**ШКУРКИ ХОРЯ БЕЛОГО,
ХОРЯ ЧЕРНОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Технические условия

Undressed skins of white fitch and black fitch.
Specifications

**ГОСТ
III46-65***

Взамен
ОСТ НКЗаг 416,
ОСТ НКЗаг 418
и ГОСТ 6506-53

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 2 февраля 1965 г. Срок введения установлен

с 01.01. 1966 г.

Проверен в 1978 г. Срок действия продлен

до 01.01. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки белого и черного хорей из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки белого хоря имеют блестящую высокую чернобуро-бурую ость, пух белый или желтоватый. Хвост двухцветный, у основания светлый, желтоватый, конечная часть — чернобурого цвета.

Шкурки черного хоря имеют блестящую черно-бурую длинную ость с палево-ржавой подпушью. Хвост сплошь черно-буровой окраски.

3. Шкурки должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей из ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены без повреждения корней волос и законсервированы пресно-сухим способом.

Шкурки белого хоря должны быть оправлены мездрай наружу, с затяжкой в длину (без излишней перетяжки); допускается правка шкурок на правилках; шкурки черного хоря правят волосом наружу на правилках установленной формы с соблюдением отношения ширины шкурки (по мэдре) к ее длине как 1 : 6.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. В зависимости от качества волосяного покрова шкурок белого хоря установлены кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1979 г.) с изменением № 1,
утвержденным в феврале 1979 г. (ИУС 4—1979 г.).

© Издательство стандартов, 1980

Таблица 1

Кряжи	Характеристика волосяного покрова шкурок	Районы распространения
1. Оренбургский	Высокий, средней густоты, шелковистый, концы остьевых волос черные или с коричневым оттенком. Пух белый или желто-серый	Казахская ССР (кроме Южно-Казахстанской обл.), Оренбургская обл., Башкирская АССР, Восточная и Западная Сибирь (кроме районов Бурятской АССР и Читинской обл.)
2. Саратовский	Высокий, менее густой, недостаточно шелковистый, цвет концов остьевых волос черно-коричневый. Пух желтовато-серый	Саратовская, Воронежская, Тамбовская, Куйбышевская и Волгоградская обл., Татарская АССР, Чувашская АССР и Марийская АССР
3. Юго-Восточный	Менее высокий, редковатый и грубоватый. Пух светло-желтый, концы остьевых волос рыжевато-коричневого цвета	Украинская ССР, Ростовская и Астраханская обл., Краснодарский и Ставропольский края
4. Среднеазиатский	Очень высокий, густой, мало шелковистый. Пух светло-желтый, цвет концов остьевых волос черно-смолистый	Туркменская ССР, Таджикская ССР, Узбекская ССР, Южно-Казахстанская обл. Казахской ССР, Читинская обл. и Бурятская АССР

5. По размерам шкурки белого и черного хорей должны соответствовать требованиям табл. 2.

Таблица 2

Размер шкурок	Шкурки белого хоря				Шкурки черного хоря, правленные на правилках	
	оправленные трубкой		правленные на правилках			
	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский		
Длина, см		Площадь, см ²				
Крупный	Более 45	Более 40	Более 600	Более 400	Более 600	
Средний	Более 35 до 45 вкл.	Более 30 до 40 вкл.	Более 450 до 600 вкл.	Более 300 до 400 вкл.	Более 450 до 600 вкл.	

Продолжение табл. 2

Размер шкурок	Шкурки белого хоря				Шкурки черного хоря, правленные на правилках	
	оправленные трубкой		правленные на правилках			
	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский		
Длина, см		Площадь, см ²				
Мелкий	До 35	До 30	До 450	До 300	До 450	

Примечания:

1. Длину шкурок измеряют от междуглазья до корня хвоста.
2. Площадь шкурок определяют умножением длины шкурки от междуглазья до корня хвоста на среднюю ее ширину.
3. (Исключен, Изм. № 1).
- (Измененная редакция, Изм. № 1).
6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкурки белого и черного хорей делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Описание волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосые с высокой, частой, блестящей остью и густым пухом. Хвост пушистый. Мездра чистая. У белого хоря допускается синева на лапках и легкая синева на череве между передними лапками
Второй	Менее полноволосые, с недоразвившимися остью и пухом. Хвост менее пушистый. У белого хоря допускается синева на лапках и на груди; у черного — легкая синева на огузке, голове и лапках
Третий	Половолосые с низкими, наполовину развивающимися остью и пухом. Хвост слабо опущен. Мездра у белого хоря синеватая, у черного — синяя

7. (Исключен, Изм. № 1).
8. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкурки хорей по наличию пороков подразделяют на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 4.