


М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ НЕМЫТАЯ
ЦИГАЙСКАЯ И ОДНОРОДНАЯ
ЦИГАЙ-ГРУБОШЕРСТНАЯ
КЛАССИРОВАННАЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Издание официальное



М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ НЕМЫТАЯ ЦИГАЙСКАЯ
И ОДНОРОДНАЯ ЦИГАЙ-ГРУБОШЕРСТНАЯ
КЛАССИРОВАННАЯ**

**ГОСТ
9764—74***

Технические условия

**Взамен
ГОСТ 9764—61**

Unwashed classed zigai pure breed and uniform
zigaicoarse sheep wool.
Specifications

ОКП 98 3940

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 августа 1974 г. № 1856 срок введения установлен

с 01.01.76

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется на немытую классированную однородную цигайскую шерсть, состригаемую с цигайских овец, и однородную цигай-грубошерстную шерсть, состригаемую с помесных цигай-грубошерстных овец.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цигайскую и однородную цигай-грубошерстную шерсть состригают с овец один раз в год (весной).

1.2. Цигайская шерсть характеризуется однородностью, хорошей упругостью, тониной основной массы шерсти в руне 56—44 качеств (27,1—29,0; 29,1—31,0; 31,1—34,0; 34,1—37,0; 37,1—40,0 мкм), штапельным и штапельно-косичным строением руна, крупной, ясной и слабовыраженной извитостью, в основном малым содержанием жиропота, сухостью и жесткостью на ощупь, белым цветом, с блеском и без него, отсутствием проросших мертвых и цветных волокон.

П р и м е ч а н и е . Цигайскую шерсть, засоренную мертвыми, цветными волокнами или клочками цветной шерсти, относят к шерсти, засоренной цветными или мертвыми волокнами.

1.3. Руна с цигайского молодняка в возрасте одного года с тониной основной массы шерсти 58 качества (25,1—27,0 мкм) и длиной 65 мм и более, с отсутствием шерсти тониной 60 качества (23,1—25,0 мкм), предъявленные к сдаче отдельно, относят к цигайской шерсти.

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Однородная цигай-грубошерстная шерсть характеризуется однородностью, упругостью, тониной основной массы шерсти в руне 56—44 качеств (27,1—29,0; 29,1—31,0; 31,1—34,0; 34,1—37,0; 37,1—40,0 мкм), штапельным и штапельно-косичным строением руна, средней и крупной, ясной или слабовыраженной извитостью, меньшей по сравнению с цигайской шерстью уравненностью волокон в штапеле по толщине и длине, заострением и сухостью концов наружного штапеля, различным цветом, наличием проросших сухих и мертвых волокон.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Цигайскую и однородную цигай-грубошерстную шерсть подразделяют на рунную, укороченную, кусковую и отклассировки в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание (октябрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1985 г. (ИУС 12—85)

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 1999

Таблица 1

Подразделение шерсти	Характеристика шерсти	Условные обозначения
Рунная	Шерсть, снятая с одной овцы и состоящая из штапелей и штапелей-косиц, более или менее связанных между собой в одно целое руно, неполные руна, а также незагрязненные куски шерсти, завернутые в руно, от которого они отделились	—
Укороченная	Шерсть длиной менее 65 мм	укор.
Кусковая	Незагрязненные куски шерсти массой менее 150 г каждый, предъявленные к сдаче отдельно от рун	куск.
Отклассировки: обор	Мелкие загрязненные экскрементами клочки шерсти, отделившиеся от рун при стрижке, а также получаемые при классировке путем обрыва загрязненных окраек, и шерсть, состригаемая с хвоста, внутренней поверхности ляжек, лба и щек овец	обор
клюнкер	Мелкие клочки шерсти, сильно загрязненные прилипшими к ним экскрементами, и шерсть «подстрижка» (короткие волокна повторной стрижки)	клюн.

Примечания:

1. В рунной шерсти допускается подстрижка в количестве не более 1 % от массы шерсти.
 2. Мелкие загрязненные клочки неоднородной шерсти, отделившиеся при стрижке и уборке рун, относят к шерсти «клок» по ГОСТ 19779—74.

1.6. Рунную цигайскую и рунную однородную цигай-грубошерстную шерсть подразделяют: по тонине и длине на:

классы — I, II (кроме рун с цигайского молодняка тониной основной массы шерсти 58 качества);
 по состоянию на:

нормальную,
 сорно-репейную (первой и второй группы),
 дефектную (первой и второй группы),
 сорно-репейно-дефектную.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Рунную, укороченную и кусковую однородную цигай-грубошерстную шерсть подразделяют по цвету на:

белую;
 светло-серую;
 цветную.

1.8. Укороченную и кусковую шерсть по классам и состоянию не подразделяют.

1.9. Отклассировки подразделяют на обор и клюнкер. Отклассировки по классам, состоянию и цвету не подразделяют.

1.10. Класс рунной шерсти определяют в зависимости от длины и тонины волокон основной массы шерсти, под которой понимают не менее 55 % массы или площади руна, в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование шерсти	Класс	Основная масса шерсти		Остальная масса шерсти
		Тонина волокон (качество)	Длина волокон, мм	
Цигайская	I	56—50	65 и более	Однородная тониной как выше, так и ниже пределов, указанных для основной массы
То же	II	48—44	65 и более	Однородная тониной как выше, так и ниже пределов, указанных для основной массы, с допуском на окрайках руна неоднородной шерсти косичного строения не более 3 % от массы руна

Наименование шерсти	Класс	Основная масса шерсти		Остальная масса шерсти
		Тонина волокон (качество)	Длина волокон, мм	
Однородная грубошерстная цигай-	I	56—50	65 и более	Однородная тониной 58 качества и ниже 50 качества, с допуском на окрайках руна неоднородной шерсти косичного строения
То же	II	48—44	65 и более	Однородная тониной как выше, так и ниже пределов, указанных для основной массы, с допуском на окрайках руна неоднородной шерсти косичного строения

П р и м е ч а н и е. За длину волокон шерсти принимают длину штапеля или штапеля-косицы в расправленном, но не растянутом от извивости состоянии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.11. Состояние рунной цигайской и однородной цигай-грубошерстной шерсти определяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Состояние	Характеристика состояния	Условные обозначения
Нормальная	Шерсть прочная на разрыв по органолептической оценке. Допускается шерсть, содержащая растительные легкоотделимые примеси, независимо от местонахождения их на руле, а также шерсть, содержащая растительные трудноотделимые примеси (репейник, тырса) на второстепенных частях руна (шея, брюхо, ляжка) каждая в отдельности или в общей сложности в количестве не более 10 % от площади или массы руна. Шерсть, утратившую натуральный цвет по всей площади руна более чем на $\frac{1}{3}$ длины штапеля или штапеля-косицы (изменение цвета шерсти ясно заметно в немытой шерсти) вследствие неправильного купания или содержания овец, относят к пожелтевшей	норм.
Сорно-репейная: первая группа	Шерсть, содержащая растительные легкоотделимые примеси в количестве более 10 до 30 % от площади или массы руна, или шерсть, содержащая растительные трудноотделимые примеси не более 15 % от площади или массы руна независимо от местонахождения их на руле. При наличии в руле одновременно легкоотделимых и трудноотделимых примесей общее количество засоренной этими примесями шерсти не должно превышать 30 % от площади или массы руна, в том числе шерсти, содержащей трудноотделимые примеси, не более 15 % от площади или массы руна. В остальном характеристика та же, что и для нормальной шерсти	пожел. ср. 1 гр.
вторая группа	Шерсть, содержащая растительные легкоотделимые и трудноотделимые примеси в количестве, превышающем установленные допуски для первой группы сорно-репейной шерсти. В остальном характеристика та же, что и для нормальной шерсти	ср. 2 гр.
Дефектная: первая группа	Шерсть с переследом у основания или на конце штапеля (штапеля-косицы). В остальном характеристика та же, что и для нормальной шерсти	деф. 1 гр.
вторая группа	Шерсть с переследом посередине штапеля (штапеля-косицы) или с переследом у основания и одновременно на конце штапеля (штапеля-косицы), а также шерсть, потерявшая натуральный цвет и прочность на разрыв вследствие неправильного купания или содержания овец. В остальном характеристика та же, что и для нормальной шерсти	деф. 2 гр.
Сорно-репейно-дефектная	Шерсть сорно-репейная первой или второй группы и одновременно дефектная первой или второй группы	срд.