

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЗАЙЦА-РУСАКА  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 6363—67**

**Издание официальное**

БЗ 6-93 /1000-

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ЗАЙЦА-РУСАКА  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Gray Hare skins undressed.  
Specifications

ГОСТ

6363—67\*

ОКП 98 7843

Взамен  
ГОСТ 6363—52

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.06.67. Срок введения установлен

с 01.07.68

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки зайца-русака из отряда грызунов, семейства заячих.

2. Шкурки зайца-русака зимой должны иметь волосяной покров серо-голубой или бело-серо-голубой окраски разной интенсивности с большим или меньшим овалом каштановой окраски во хребту. Бока и черево белые или серо-желтые. Остевые волосы шкурок слегка волнистые, хвост с черной полосой вдоль его верхней части.

3. Шкурки зайца-русака должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку или пластом, с продольным разрезом ровно посередине черева, с сохранением меха головы, лап до ступни и хвоста; очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей из лап, ушных хрящей; очищены от грязи и крови с мездры и волоса и законсервированы пресно-сухим способом. Шкурки, снятые трубкой, должны быть оправлены мездрай наружу (высушены на правилках).

4. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки зайца-русака делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

| Сорт   | Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок   |
|--------|---|
| Первый | Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом или со слегка переп |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (сентябрь 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1988 г. (ИУС 12—88).

(©) Издательство стандартов, 1994

Продолжение табл. 1

| Сорт   | Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок   |
|--------|---|
| Второй | девшими остьевыми и пуховыми волосами на боках и огузке; мездра плотная или уплотненная, грубоватая, без признаков синевы или с легкой синевой по краю огузка, бокам и душке<br>Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися направляющими остьевыми и пуховыми волосами, особенно на боках и шейной части; мездра плотная с синевой по бокам, душке и на огузке |
| Третий | Половолосый, со слаборазвитыми остью и пухом, с наличием на боках и шейной части летних остьевых волос рыжей окраски; мездра плотная, темно-синяя по бокам и шейной части   |

5. В зависимости от наличия пороков шкурки зайца-русака подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование порока   | Группа дефекта |          |           |
|---|----------------|----------|-----------|
|   | Малый          | Средний  | Большой   |
| 1. Дыры общей площадью к площади шкурки в %                       | 1,1—3,0        | 3,1—10,0 | 10,1—20,0 |
| 2. Плешины общей площадью к площади шкурки в %                    | 1,1—3,0        | 3,1—8,0  | 8,1—15,0  |
| 3. Запекшаяся кровь на волосе общей площадью к площади шкурки в % | 3,1—5,0        | 5,1—10,0 | 10,1—20,0 |

Примечание. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки, правленной на правилках, и на полную ширину шкурки, снятой пластом.

6. В дефектных шкурках допускают не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», три порока, предусмотренных для группы дефектов «малый»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», один порок, предусмотренный для группы дефектов «средний», и два