

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ШКУРКИ НОРКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 7908—69

Издание официальное



Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ШКУРКИ НОРКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed mink skins

**ГОСТ
7908—69*****Взамен
ГОСТ 7908—61**

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 28 февраля 1969 г. № 293 срок введения установлен с 01.07.70

Постановлением Госстандарта СССР от 26.03.87 № 976 срок действия продлен до

01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки норки клеточного разведения и норки вольной (добытой охотой).

Шкурки норки подразделяют:

по сортам — на первый, второй и третий (для шкурок вольной норки);

по группам дефектов — на «малую», «среднюю» и «большую»; шкурки норки клеточного разведения — по цветам и размерам.

Кроме того, шкурки вольной норки — по кряжам.

Шкурки норки клеточного разведения, имеющие особо густые пуховые волосы длиной на хребте не менее 20 мм и равномерно расположенные по всей площади шкурки, кроме черева, остевые волосы, по длине значительно превышающие пуховые волосы, относят к соболиным (длинноволосым) шкуркам.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Шкурки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап и хвоста, очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей; фаланги пальцев тщательно удалены от шкурки; волосяной покров и мездра хорошо обезжирены без повреждений корней волос; очищены от грязи и


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1979 г. (ИУС 11—79).

© Издательство стандартов, 1988

крови с мездры и волоса; оправлены волосом паружу на правилках установленной формы (см. чертеж) и законсервированы пресносухим способом с симметрично растянутым в ширину и припосаженным по длине хвостом; передние лапы заправлены внутрь шкурки, допускается удаление коготков; ступни задних лап вывернуты мездрой наружу, коготками внутрь в форме мешочка («кулачка»).



Номер правилки	Размеры в мм									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Р
1	350	28	30	40	51	58	65	78	1200	15
2	300	25	28	37	48	56	63	74	1100	15
3	250	24	26	34	44	54	58	68	1000	14
4	210	23	25	32	42	45	45	58	900	14

3. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки норки делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок
Первый	<p>Полноволосый, развившийся, блестящий, с густыми остью и пухом. Мездра чистая. Допускается легкая синева на огулке шириной до 3 см от его края, хвосте и лапах</p> <p>Менее полноволосый, блестящий, с недоразвившимся остью и пухом. Хвост недостаточно опущенный. Мездра с легкой синевой до передних лап у клеточной норки и по всей площади шкурки вольной норки</p> <p>Полуволосый, ровный, густой, блестящий, хвост мало опущенный. Мездра синяя</p>
Второй	
Третий (для вольной норки)	

Примечание. Сортность шкурок белых, серебристо-голубых, сапфировых, «голубой ирис» и других голубых цветов определяют по качеству волосяного покрова без учета мездры.

4. В зависимости от наличия пороков шкурки норки подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование пороков	Группы дефектов		
	малая	средняя	большая
1. Разрывы и швы общей длиной в % к длине шкурки:			
для клеточной норки	5,1—15,0	15,1—40,0	40,1 до однократной длины шкурки или шкурки, перерванные поперек
для вольной норки	10,1—25,0	25,1—50,0	50,1 до однократной длины шкурки или шкурки, перерванные поперек
2. Дыры, вытертые места, битая или сеченая ость в % к общей площади шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Пleshины общей площадью в % к площади шкурки	Не допускаются	До 0,5	0,6—2,0
4. Участки с невылинявшими лeтними рыжими волосами в % к общей площади шкурки:			
для клеточной норки	До 0,5	0,6—2,0	2,1—4,0
для вольной норки	1,1—3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
5. Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос общей площадью в % для клеточной норки	10,1—20,0	20,1—30,0	30,1—50,0
6. Признаки ливьки (рапневесенней)	Не допускаются	Шкурки новолосые, со слегка поредевшей остью и пухом на боках или шейной части	—