

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

при  
Совете Министров  
СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ШКУРКИ КОЛОНКА  
И СОЛОНГОЯ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Kolinsky and solongoi sk.n.s  
undressed

ГОСТ  
12419—66

Вамен  
ГОСТ 6372—52  
и ГОСТ 6487—53

Группа С82

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки колонка и солонгоя (горного колонка) из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки колонка имеют волосяной покров рыжевато-желтого цвета, а шкурки солонгоя — с более низким волосяным покровом песочно-желтого цвета

3. Шкурки колонка и солонгоя должны быть сняты чулком с головы, с закрытым огузком или трубкой, с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, хрящей и сухожилий, костей из лап и хвоста; очищены от грязи и запекшейся крови с мездры и волоса; оправлены мездрой наружу на правилках установленной формы с отношением ширины шкурки к ее длине 1:8 (для шкурок колонка) и 1:7 (для шкурок солонгоя) и законсервированы пресно-сухим способом; мездра должна быть хорошо обезжирена без повреждения корней волос.

4. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения колонка шкурки подразделяются по крижам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименование крижей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
1. Амурский	Амурская область, кроме Желтулакского, Зейского и Тыгдинского районов; Приморский край; Амурский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, им. Лазо, Нанайский, Ульчский, Хабаровский районы Хабаровского края и Еврейская автономная область	Густой, высокий, грубоватый

Внесен Центросоюзом

Утвержден Комитетом стандартов,  
мер и измерительных приборов  
при Совете Министров СССР  
17/XII 1966 г.

Срок введения  
1/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 3 коп.

Перепечатка воспрещена

*Продолжение*

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
2. Тобольский	Новосибирская, Томская, Тюменская, Омская, Свердловская, Курганская и Челябинская области	Высокий, густой и малошелковистый. Мездра плотная и менее плотная
3. Башкирский	Башкирская АССР; Татарская АССР; Пермская область	Менее густой, мездра плотная
4. Енисейский	Красноярский и Алтайский края; Тувинская АССР; Кемеровская область; Казахская ССР	Высокий, шелковистый. Мездра менее плотная
5. Якутский	Якутская АССР; Бадайбинский, Братский, Жигаловский, Катарский, Качугский, Казачинский, Ленский, Киренский, Нижне-Илимский, Усть-Кутский, Мамско-Чуйский, Нижнеудинский районы Иркутской области; Каларский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский районы Читинской области; Желтулакский и Зейский районы Амурской области; Хабаровский край, кроме районов, указанных в Амурском кряже; Северо-Байкальский и Баунтовский районы Бурятской АССР	Густой, шелковистый. Мездра плотная
6. Забайкальский	Иркутская, Читинская области и Бурятская АССР, кроме районов, указанных в Якутском кряже; Тугдинский район Амурской области	Густой, малошелковистый. Мездра плотная

Примечание. Шкурки, поступившие из районов, не перечисленных в табл. 1, относятся к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волосяного покрова.

Шкурки колонка и солонгоя невыделанные

ГОСТ 12419—66

5. По размерам шкурки колонка и солонгоя должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименования пород	Площадь шкурок в см <sup>2</sup>		
	Крупный	Средний	Мелкий
<b>Шкурки колонка</b>			
1. Амурский	Более 525	Более 425 до 525 вкл.	До 425 вкл.
2. Тобольский	Более 475	Более 350 до 475 вкл.	До 350 вкл.
3. Башкирский	Более 480	Более 380 до 480 вкл.	До 380 вкл.
4. Енисейский	Более 400	Более 325 до 400 вкл.	До 325 вкл.
5. Якутский	Более 340	Более 260 до 340 вкл.	До 260 вкл.
6. Забайкальский	Более 300	Более 225 до 300 вкл.	До 225 вкл.
<b>Шкурки солонгоя</b>			
	Более 250	Более 150 до 250 вкл.	До 150 вкл.

Примечание. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее от середины междуглазья (по средней линии хребта) до корня хвоста на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки колонка и солонгоя делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок	
	колонка	солонгоя
Первый	Полноволосый, развившийся, с высокой частой остью и густым пухом. Мездра без синевы. Хвост пушистый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом. Мездра чистая

Продолжение

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок	
	колонка	солонгоя
Второй	Менее полноволосяный, с недостаточно развитыми остью и пухом. Мездра с легкой синевой по хребту от огузка до половины шкурки. Хвост недостаточно опушен	Полуволосяный, с недостаточно развитыми остью и пухом. Мездра синеватая
Третий	Полуволосяный со слабо развитыми остью и пухом. Мездра синяя. Хвост слабо опушен	

7. В зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Разрывы общей длиной в процентах к длине шкурки	До 10,0 вкл.	10,1—20,0	20,1—50,0; шкурки, перерываемые поперек
2. Дыры и вытертые места в процентах к общей площади шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Плесени в процентах к общей площади шкурки	Не допускаются	До 1,0	1,1 2,0