

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**КАРАКУЛЬЧА ЧИСТОПОРОДНАЯ  
И МЕТИСНАЯ НЕВЫДЕЛАННАЯ  
(КАРАКУЛЬ-КАРАКУЛЬЧА,  
КАРАКУЛЬЧА И ГОЛЯК)**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10701—63**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**КАРАКУЛЬЧА ЧИСТОПОРОДНАЯ  
И МЕТИСНАЯ НЕВЫДЕЛАННАЯ  
(КАРАКУЛЬ-КАРАКУЛЬЧА, КАРАКУЛЬЧА И ГОЛЯК)**

**ГОСТ  
10701-63\***

**Технические условия**

Broadtail of pure breed and metis  
(Persian lamb-broadtail and golyak).  
Specifications

Взамен  
ОСТ НКЗар 376,  
ОСТ НКЗар 377  
и ОСТ НКВТ 8809/609

ОКП 98 9654

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 3 декабря 1963 г. Срок введения установлен

с 01.01.65

Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 18.10.82 № 3998  
срок действия продлен

до 01.01.88

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки выпоротков и выкидышей чистопородных каракульских овец и метисов, полученных от скрещивания овец различных грубошерстных пород с чистопородными каракульскими баранами.

2. Для шкурок чистопородной каракульчи характерен шелковистый блестящий волосяной покров и форма хвоста, характерная для чистопородных каракульских ягнят.

3. Для шкурок метисной каракульчи характерен грубоватый со стекловидным блеском волосяной покров, хвост широкий у основания, укороченный, заканчивающийся еле заметным придатком или без него, короткий или удлиненный.

4. Шкурки каракульчи должны быть законсервированы сухо-соленым и квашеным способами (см. приложение 1, черт. 2).

5. В зависимости от цвета волосяного покрова шкурки делятся на:

а) черные — волосяной покров черного цвета по всей площади шкурки;

б) серые — волосяной покров серого цвета, состоящий из смешанных черных и белых волос в различном соотношении, образующих разные оттенки;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (июнь, 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1967 г. и июне 1984 г. (ИУС 5-67; 10-84).

© Издательство стандартов, 1985

в) сур — волосяной покров, имеющий неравномерное по длине волоса распределение окраски: темное основание с постепенным переходом к более светлому кончику волос, образующим зональность окраски волосяного покрова;

г) цветные однотонные — шкурки с волосяным покровом других, кроме черного, серого и сур цветов и оттенков, а также шкурки черного цвета с сединой («морозом»);

д) пестрые — волосяной покров с пестринами (пятнами) другого по сравнению с основным цвета на остальной, кроме головы, хвоста и ножек, площади шкурки, превышающими 12 см<sup>2</sup>.

Примечание. Шкурки с пятнами на голове, ножках и хвосте другого по сравнению с основным цвета, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на боках не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей 12 см<sup>2</sup>, считаются одноцветными;

е) розовые (гулигаз) — волосяной покров розовых оттенков, от светлого до темно-розового, образующийся от смешения белых и коричневых волос.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. По видам шкурки подразделяются на:

а) каракуль-каракульчу — шкурки с низким несколько приподнятым шелковистым, блестящим волосяным покровом, образующим узкие гривки и вальки, низкие вальковатые завитки или узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком. Мездра утолщенная.

Для метисных шкурок волосяной покров стекловидно-блестящий;

б) каракульчу — шкурки с коротким шелковистым блестящим волосяным покровом, плотно прилегающим к мездре, с ясно выраженным муаристым рисунком. Мездра тонкая. Для метисных шкурок волосяной покров стекловидно-блестящий;

в) голяк — шкурки с очень низким гладким блестящим или слабо-блестящим волосяным покровом с едва заметным муаристым отливом или без него.

Для метисных шкурок волосяной покров стекловидно-блестящий с едва заметным муаристым отливом.

6а. В зависимости от площади шкурки каракуля-каракульчи и каракульчи подразделяют на размеры в соответствии с табл. 1а.

Таблица 1а

Размер	Площадь шкурок, см <sup>2</sup>	
	сухо-соленых	квашеных
Крупный	Св. 900	Св. 800
Средний	Св. 600 до 900 включ.	Св. 400 до 800 включ.
Мелкий	От 400 до 600 включ.	От 300 до 400 включ.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

7. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки каракуля-каракульчи, каракульчи и голяка делятся на следующие сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Сорт	Характеристика волосяного покрова
<b>Каракуль-каракульча</b>	
Первый	Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади шкурки
Второй	Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50% площади шкурки
Третий	Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком, распространенные менее чем на 50% площади шкурки
<b>Каракульча</b>	
Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75% площади шкурки
Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади шкурки
Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50% площади шкурки или со слабо выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади шкурки
<b>Голяк</b>	
Первый	Очень короткий волосяной покров с едва заметным муаристым отливом
Второй	Очень короткий волосяной покров без муаристого отлива
Третий	Матовый редкий волосяной покров

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки каракульчи и каракуля-каракульчи подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование порока	Группа	
	первая	вторая
Разрывы, подрезы, прорезы и швы общей длиной, см	Св. 5 до 15 включ.	Св. 15 до 30 включ.
Выхваты с краев, дыры, вытертые места с наличием основания волос общей площадью, см <sup>2</sup>	До 16 включ.	Св. 16 до 32 включ.
Кожедины общей площадью, см <sup>2</sup>	—	До 32 включ.
Отсутствие частей шкурки	Головы или хвоста	Головы с шей