

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
13055—67

Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов при Совете
Министров СССР

ШКУРЫ ВОЛКА И ШАКАЛА
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Wolf and jackal skins
undressed

Взамен
ОСТ НКЗг 387 и
ГОСТ 6609—53

Группа С82

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры волка и шакала из отряда хищных, семейства собачьих.

2. Зимние шкуры волка имеют волосяной покров темно- и светло-голубого, темно- и светло-серого, серо-бурого и темно-рыжего цветов. По характеру волосяного покрова шкуры волка подразделяют на мягкий—лесной и грубый—степной.

3. Зимние шкуры шакала имеют волосяной покров темно-серого или ржаво-серого цветов с буроватой полосой по хребту.

4. Шкуры волка и шакала должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей и сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом наружу по установленной форме и законсервированы пресно-сухим способом.

5. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения волка шкуры подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова
1. Полярный	Камчатская область; Чукотский национальный округ Магаданской обл.; северные районы Якутской АССР; Таймырский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий национальные округа; Мурманская область	Особо пышный, светло- и темно-голубого цвета с серо-голубым пухом; ость блестящая. Череве рослое, шелковистое. Хвост пушистый

Внесен
Центросоюзом

Утвержден Комитетом стандартов,
мер и измерительных приборов
при Совете Министров СССР
12/VII 1967 г.

Срок введения
1/VII 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена



Продолжение

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова
2. Сибирский	Восточная и Западная Сибирь, кроме областей и округов, указанных в полярном кряже; Свердловская, Челябинская и Курганская обл.; Северо-Казахстанская, Кокчетавская, Павлодарская, Семипалатинская и Восточно-Казахстанская обл. Казахской ССР	Пышный и грубоватый серо-голубой, темно-серый с голубым пухом или серо-буроватым оттенком по хребту
3. Казахский	Казахская ССР, за исключением областей, указанных в Сибирском кряже; северная часть Киргизии	Пышный светло-серого цвета и голубоватый серовато-желтого цвета
4. Центральный	Белорусская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР; Европейская часть РСФСР, за исключением районов, указанных в Южном кряже	Менее пышный, грубоватый и грубый серого и темно-серого цвета с серо-бурым оттенком по хребту
5. Южный	Украинская, Туркменская, Таджикская, Молдавская, Грузинская, Армянская и Азербайджанская ССР; южные районы Киргизской ССР; Ставропольский край, Краснодарский край, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР	Грубоватый и грубый светло-серого, серовато-желтого и темно-рыжего цвета по хребту

Примечания

1. Шкуры, поступающие из районов, не перечисленных в табл. 1, относят к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волосяного покрова.

2. Шкуры шакала по кряжам не подразделяют.

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкуры волка и шакала подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Характеристика волосяного покрова и мездры шкур
Первый	Полноволосый, с развитым волосяным покровом, с высокой частой остью и густым пухом; мездра чистая
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитым остью и пухом; мездра синеватая
Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом; мездра синяя

7. В зависимости от наличия пороков шкуры волка и шакала подразделяются на группы дефектов в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Разрывы обшей длиной к длине шкуры в %	20,1—40,0	40,1—80,0	Более 80,0 до однократной длины шкуры
2. Дыры и вытертые места обшей площадью к площади шкуры в %	0,5—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Плесени обшей площадью к площади шкуры в %	До 0,5	0,6—1,0	1,1—2,0
4. Признаки весенней линьки	Не допускаются	Шкуры ранневесенние, перерезанные с поредевшим волосяным покровом на боках, огулке или шейной части	Шкуры весенние со значительной потертой волосяного покрова на боках, огулке или с сильно поредевшим волосяным покровом на шейной части и лопатках

Примечание Шкуры волка и шакала, имеющие разрывы обшей длиной до 20% длины шкуры, дыры и вытертые места до 0,5% площади шкуры, дефектными не считают.

8. На дефектных шкурах допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурах, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока группы дефектов «малый»;

на шкурах, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При совокупности одного порока, относимого к группе дефектов «средний», и двух пороков, относимых к группе дефектов «малый», шкуры переводят в группу дефектов «большой».

9. Шкуры волка и шакала, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкуры поздневесенние в стадии явной линьки с выпадающим во-