

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЦВЕТКИ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ

ГОСТ

16800—71

Flores Sambuci nigrae
Elder flowers

Взамен

ОСТ НКВТ 6618/208

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 марта 1971 г. № 457 срок введения установлен

с 01.01.72

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол З—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные и отделенные от цветоножек распустившиеся цветки и бутоны дикорастущего и культивируемого кустарника бузины черной (*Sambucus nigra L.*) семейства жимолостных (*Caprifoliaceae*), предназначенные для использования в качестве лекарственного сырья.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цветки бузины должны быть собраны в период цветения и по показателям качества соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателей	Нормы
1. Внешний вид	<p>Отдельные цветки и бутоны с короткими голыми цветоножками или без них.</p> <p>Цветки состоят из едва заметной пятизубчатой спайнолистной чашечки, венчика из 4—5 лепестков, сросшихся между собой у основания, пяти тычинок, приросших к трубке венчика, со светло-желтыми пыльниками и полунижней завязью. Распустившиеся цветки диаметром до 5 мм, нераспустившиеся — до 2 мм</p>

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание

Наименование показателей	Норма
2. Цвет	Желтоватый
3. Залак	Ароматный
4. Вкус	Пряный
5. Влажность, %, не более	14,0
6. Массовая доля общей золы, %, не более	10,0
7. Массовая доля побуревших цветков, %, не более	8,0
8. Массовая доля других частей растения (цветоножек, веточек соцветий и листьев), %, не более	10,0
9. Массовая доля измельченных частиц, проходящих сквозь сито по ТУ 23.2.2068—89 с отверстиями диаметром 1 мм, %, не более	8,0
10. Массовая доля посторонних примесей, %, не более:	
органической (части других неядовитых растений)	1,0
минеральной (земля, песок, камешки, пыль)	1,0

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Приемку, отбор образцов цветков бузины черной и определение их качества проводят по ГОСТ 24027.0—80 — ГОСТ 24027.2—80 с дополнениями, указанными в п. 2.1.1.

2.1.1. Для установления подлинности сырья изучают анатомическое строение цветка бузины, которое должно соответствовать описанному ниже.

При рассмотрении цветка с поверхности под микроскопом (см. чертеж) видно, что клетки верхнего эпидермиса лепестка многоугольные со слабо извилистыми тонкими стенками, по краю лепестка — сосочкообразные. Клетки нижнего эпидермиса более крупные, с сильно извилистыми стенками. Устьица встречаются только с нижней стороны лепестка. Кутикула волнистая.

Клетки эпидермиса наружной стороны чашелистика с мало извилистыми тонкими стенками, устьица округлые, кутикула мелковолнистая.

На нижней поверхности чашелистика имеются простые и железистые волоски. Простые волоски мелкие, одноклеточные, тонкостенные, с продолговато-бородавчатой кутикулой; железистые волоски крупные, с многоклеточной головкой различной формы на многоклеточной ножке. Такие же волоски, простые железистые, встречаются на цветоножке.